

## Mahd-Termine

<i>Biotop</i>	<i>Januar</i>	<i>Februar</i>	<i>März</i>	<i>April</i>	<i>Mai</i>	<i>Juni</i>	<i>Juli</i>	<i>August</i>	<i>September</i>	<i>Oktober</i>	<i>November</i>	<i>Dezember</i>
Kraut im / am Graben												
Röhricht (auch im Graben)												
Blühwiese												
Wiesenknopf												
Mehrjährige Blühstreifen im Acker <sup>1</sup>												

<b>empfohlen</b>	<i>Im Herbst zur Abmagerung der Wiese nach der Entwicklung der Samen - Entfernung des Mahdguts nach kurzer Liegezeit</i>
<b>optional</b>	<i>Im Sommer nach Samenreife der Blühpflanzen Rückschnitt von Gras</i>
<b>verboten</b>	<i>Brut- und Setzzeit, Flugzeit des Wiesenknopf-Ameisenbläulings, Störungen der Samenentwicklung von Blühpflanzen</i>

<sup>1</sup> Bewirtschaftung angelehnt an HALM2: mind. 1 Mahd in 5 Jahren, jeweils 25-50% der Fläche; Stauden als Ansitze für Feldvögel und für Insekten möglichst lange stehen lassen.